

Campanula takesimana Nakai

수형

초롱꽃과 Campanulaceae















• 울<mark>릉도의 낮은</mark> 숲속 사면 저지대나 산지의 비탈진 풀밭에서 자람


• 여러해살이풀로 키 30~150cm 정도로 자람




• <mark>잎은 삼각모양 혹은 심장모양으로 광택이 있으며,</mark> 흰색 털이 난다. 꽃은 6~8월에 흰색~연한 자색으로 피며, 검은색 반점이 있다. 열매는 9~10월에 익는다.









- 스킨답서스 27%, 섬초롱꽃 37%로, 섬초롱꽃이 총휘발성 유기화합물 제거 효율이 더 높게 나타났다.
- *실험 시기에 따라 다소 결과에 차이가 있을 수 있음



증식

- 종자로 증식 시, 멸균된 물에 24시간 담근 후 파종하면 발아율이 높다.
- 영양생식은 주로 포기나누기를 실시하며, 뿌리와 뿌리줄기가 충분히 자란 개체를 나누어 심는다. 뿌리가 손상되지 않도록 주의하고, 나눈 포기는 배수가 잘 되는 토양에 정식한다.





- 햇볕이 잘 드는 창가에 두고 가꾼다.
- 물은 주 1~2회 간격으로 주되, 계절별로 횟수를 줄이거나 늘인다. 토양이 지나치게 습하면 뿌리가 썩을 수 있으니 주의한다.
- 특별한 병충해는 없으나 간혹 진딧물이 생길 수 있다. 진딧물이 발생하면 가정용 진딧물 방제약을 사용하거나 주방세제를 활용한 천연살충제로 방제한다.

