

Prunella asiatica Nakai

꿀풀과 Lamiaceae



주 1~2회























국내 분포


• 여러해살이풀로 키 20~60cm 정도로 자람



• 잎은 달걀모양 또는 달걀상 타원모양으로 가장자리를 따라 톱니가 조금 있다. 꽃은 5~7월에 피는데, 이삭모양의 꽃차례를 따라 보라~분홍색의 꽃이 빽빽이 달린다. 열매는 9~10월에 익는다.

## 총휘발성 유기화합물 제거능





- 스킨답서스 27%, 꿀풀 29%로, 꿀풀이 총휘발성 유기화합물 제거 효율이 더 높게 나타났다.
- \*실험 시기에 따라 다소 결과에 차이가 있을 수 있음







- 종자로 증식시, 빛이 없는 4°C 환경에서 멸균된 물에 24시간 담근 후 파종하면 발아율이 높다.
- 영양생식은 주로 포기나누기를 실시하며, 뿌리와 뿌리줄기가 충분히 자란 개체를 나누어 심는다. 뿌리가 손상되지 않도록 주의하고, 나는 포기는 배수가 잘 되는 토양에 정식한다.

- 햇볕이 잘 드는 창가에 두고 가꾼다.
- 물은 주 1~2회 간격으로 주되, 계절별로 횟수를 줄이거나 늘인다. 토양이 지나치게 습하면 뿌리가 썩을 수 있으니 주의한다.
- 특별한 병충해는 없으나 간혹 진딧물이 생길 수 있다. 진딧물이 발생하면 가정용 진딧물 방제약을 사용하거나 주방세제를 활용한 천연살충제로 방제한다.



